ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 06-02-2024

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-02-06 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-02-07	2024-02-08	2024-02-09	2024-02-10	2024-02-11
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	24.0	24.0	23.0	23.0	24.0
न्यूनतम तापमान(से.)	14.0	11.0	8.0	9.0	10.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	31	31	22	24	26
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	14	10	12	13
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	21	12	8	16	15
पवन दिशा (डिग्री)	62	37	65	55	47
क्लाउड कवर (ओक्टा)	8	5	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 23.0 से 24.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 09.0 से 14.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

सामान्य सलाहकार:

जीरे की फसल में बीज बनने की अवस्था पर हल्की सिंचाई करें। जीरे की फसल में फसल में एफिड कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 ई सी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।

लघु संदेश सलाहकार:

जौ की फसल में बुवाई के 65-70 दिन बाद दूसरी सिंचाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	किसान भाई सरसों की फसल में दाना पकते समय बुवाई के 90 दिन बाद सिंचाई करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	बादल छाएं रहने के कारण जीरा की फसल झुलसा रोग की आशंका रहती है। अतः रोग की रोकथाम के लिए मैन्कोजेब 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।
लहसुन	लहसुन में थ्रिप्स कीट (पर्ण जीवी कीट) के प्रकोप की सम्भावना है। यह कीट पत्तियों से रस चूसता है जिससे पत्तिया कमजोर पड़ जाती है तथा हानि वाले स्थान पर सफेद चकतें पड़ जातें है। इस कीट के नियंत्रण हेतु मिथाइल डिमेटोन 25 ई.सी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
मेंथी	मैथी में मोयला कीट का प्रकोप दिखाई देने पर थायोमिथोक्जाम 25 डब्ल्यू.जी. 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।
प्याज	प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के लिए मैलाथियान 50 ई.सी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिडकाव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेड़	इस समय भेड व बकरी में माता एंव कन्टेजियस एक्थाईमा (ORF) की सम्भावना भी अधिक रहती है। यदि भेड व बकरी में माता रोग से बचाने के टीके नहीं लगवाएं है तो टीकाकरण करवा लें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	अगर खेत में खरपतवार दिखाई दे तो उसे हटा दें क्यों की यह समय खरपतवारों के बीज बनने का समय है। अगर खरपतवारों को हटा दिया जाए तो अगले वर्ष खरपतवारों के नियंत्रण में आसानी होगी।
सामान्य सलाह	कुष्माण्ड कुल की ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई हेतु खेत तैयार करें अन्तिम जुताई के समय 20-25 टन देशी खाद प्रति हैक्टेयर की दर से खेत में डालें।