



**Gramin Krishi Mausam Sewa**  
India Meteorological Department  
ICAR - Central Arid Zone Research Institute  
Jodhpur, Rajasthan



## Agromet Advisory Bulletin

Date : 08-05-2020

Weather Forecast of JODHPUR(Rajasthan) Issued On : 2020-05-08(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-05-09	0.0	44.0	28.0	42	9	18.0	230	1
2020-05-10	0.0	43.0	28.0	49	12	14.0	230	0
2020-05-11	0.0	42.0	27.0	53	12	15.0	230	0
2020-05-12	0.0	42.0	28.0	52	13	13.0	230	3
2020-05-13	1.0	43.0	29.0	52	16	18.0	230	1

### Weather Summary/Alert:

There is a possibility of partial cloudy sky and no rainfall in coming five days.

आने वाले दिनों में आंशिक बादल छाये रहने तथा वर्षा नहीं होने की सम्भावना ।

### General Advisory:

Farmers are advised to apply deep summer ploughing for the control of insects, disease and nematode.

मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी ग्रीष्मकालीन जुताई करें जिससे खरपतवार, कीट एवं बीमारियों के नियंत्रण में सहायता मिलती है।

### SMS Advisory:

Recommended seed rates 2 kg per hectare for sowing of BT cotton.

बी.टी. कपास की बुवाई के लिए 2 किलो बीज प्रति हैक्टेयर उपयोग में लें।

### Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
OKRA/ LADIES' FINGER	For the control of red mite attack in okra crop, spray Methyl Demeton 25 EC @ 0.1 ml per liter water. भिण्डी में लाल मक्की का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु मिथाइल डिमेटोन 25 ई.सी. 0.1 एम.एल. को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

### Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
WATER MELON	For the control of fruit fly attack in muskmelon and watermelon, spray Malathion 50 EC@ 1 ml per liter water.

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
	खरबूजा व तरबूज में फल मक्खी के प्रकोप से फल सड़ने लगते हैं फल मक्खी का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु मैलाथियान 50 ई.सी. 1 मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

**Others(Soil Testing/Conservation /Land Preparation Specific Advisory:**

Others(Soil Testing/Conservation /Land Preparation(Varieties)	Others(Soil Testing/Conservation /Land Preparation Specific Advisory
GENERAL ADVICE	<p>Those farmers who have irrigation facility and plan to grow cumin in coming winter season are advised to collect residue of mustard can be incorporated @ 2.5 t ha-1 in the field to be planted with cumin. At the time of high temperature in May, field should be irrigated in order to decompose residues. This will facilitate release of biotoxic volatiles killing cumin wilt pathogen.</p> <p>जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है एवं आगामी रबी की फसल में जीरा लगाना चाहते हैं तो उस खेत में सरसों की फलकटी 2.5 टन व 0.5 टन सरसों की खली प्रति हेक्टर का भुरकाव करके तवीये निकाल कर एक सिंचाई तेज गर्मी के समय दें ताकि फलकटी व खल के सड़ने से जो गैस निकले उससे उखटा रोग की फंफूद अभी ही खत्म हो जाये। यह कार्य तेज गर्मी के समय पर करना जरूरी है।</p>