



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 10-12-2024

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-12-10 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-12-11	2024-12-12	2024-12-13	2024-12-14	2024-12-15
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	22.0	22.0	23.0	21.0	22.0
न्यूनतम तापमान(से.)	9.0	9.0	9.0	7.0	8.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	10	10	8	7	6
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	21	17	16	15	14
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	12	13	15	13	10
पवन दिशा (डिग्री)	59	37	40	43	57
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 21.0 से 22.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 07.0 से 09.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 10-15 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 21.0 से 22.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 07.0 से 09.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 10-15 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

लघु संदेश सलाहकार:

किसान भाई जीरा की फसल में अच्छे अंकुरण के लिए 7-8 दिन के अन्तराल पर सिंचाई करते रहें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की फसल में बुवाई के 30 से 35 दिन बाद पहली सिंचाई दे तथा सिंचाई के साथ 30 किलोग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर की दर से दें ।
चना	चने की फसल में रूट रोट रोग के लक्षण दिखाई देने पर पौधे को जड़ सहित उखाड़ने पर जड़ में सफेद फफूंद की वृद्धि दिखाई देती है। पौधा मुरझा कर सुख जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए कार्बेन्डाजिम 50 डब्ल्यू पी को 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
रेंडी	मौसम की परिस्थितियाँ अनुकूल होने के कारण अरंडी की फसल में सफ़ेद मक्खी का तीव्र प्रकोप होने की संभावना है अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिये पीले चिपकने वाले ट्रैप का प्रयोग करें तथा कीट की संख्या आर्थिक देहली स्तर से अधिक होने के पर ट्राईजॉफ़ॉ जों स 2.5 मिलीलीटर /लीटर पानी की दर से साफ़ मौसम में छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	जीरे की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए ऑक्साडाईरजिल या ऑक्सीफ्लोरफेन 50 ग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से बुवाई के 20 दिन बाद छिड़काव करें।
प्याज	प्याज की तैयार पौध की रोपाई करें। रोपाई से पूर्व 50 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस एंव 100 किलो पोटाश प्रति हैक्टेयर की दर से खेत तैयार करते समय अन्तिम जुताई के समय दें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में न्यूमोनिया के लक्षण जैसे बुखार, दस्त, नाक व आंख से पानी आना दिखाई देने पर उसे तुरन्त अन्य स्वस्थ पशुओं से पृथक कर दें और निकटतम पशुचिकित्सक से परामर्श लें।