



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 12-04-2022

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-04-12 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-04-13	2022-04-14	2022-04-15	2022-04-16	2022-04-17
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	40.0	40.0	40.0	41.0	43.0
न्यूनतम तापमान(से.)	24.0	24.0	24.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	34	40	32	21	35
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	8	11	6	3	6
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	18.0	14.0	13.0	11.0	18.0
पवन दिशा (डिग्री)	213	231	239	228	219
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	0	1	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 40.0 से 43.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24.0 से 25.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

सामान्य सलाहकार:

किसान भाई भण्डारण से पूर्व अनाज को अच्छी तरह सुखा लें तथा अनाज को अच्छी तरह साफ करने के बाद ही बोरियों, ड्रम या कोठी में भरें। जहां तक सम्भव हो नई बोरियां ही प्रयोग में लें तथा पुरानी बोरियों को धूप में अच्छी तरह सुखाकर ही प्रयोग में लें।

लघु संदेश सलाहकार:

आने वाले दिनों में लू चलने के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
भिण्डी	जायद भिण्डी की फसल में पीतशीरा मोजेक वायरस रोग की सम्भावना है। इस रोग के प्रकोप से पत्तियां एवं फल पीले पड़ जाते हैं। इस रोग का संचार सफेद मक्खी नामक कीट से होत है। इसके नियंत्रण हेतु फूल आने से पहले लिए इमिडाक्लोप्रिड या एसीटामीप्रिड 3-5 मि.ली. का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करे।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
बकरा	बकरियों में पिस्सू व हरडा जैसे परजीवियों के रोकथाम के लिए, बकरियों को सुबह बाड़ें से बाहर निकाल कर बाड़ें में साइपरमेंथ्रीन के 10 प्रतिशत का 3 मि.ली. प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	किसान भाई सब्जियों व बागानों में अतिरिक्त सिंचाई अवश्य दे। सब्जियों व बागानों में वाष्पीकरण द्वारा जल की हानि को कम करने के लिये घास फूस व पालिथीन आदि की पलवार का प्रयोग करें।
सामान्य सलाह	गर्मियों में शुष्क क्षेत्रों में हरे चारे की कमी हो जाती है, अतः पंजिकृत पशु चिकित्सक की सहला से प्रोटीन युक्त, उच्च पोषण वसली यूरिया-मोलसेज ईटो का निर्माण करके पशुओं को खिलाएं।
सामान्य सलाह	जिन क्षेत्रों में कपास की बुवाई करनी है वहां बुवाई के 2-3 सप्ताह पूर्व खेत में 15-20 टन गोबर की खाद प्रति हैक्टेयर की दर से डालें।
सामान्य सलाह	किसान भाई कटाई की हुई फसलों को खेत में खुला ना छोड़ें, एक स्थान पर इकट्ठा कर त्रिपाल से ढक कर रखें।