



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान  
जोधपुर, राजस्थान



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 18-10-2021

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-10-18 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-10-19	2021-10-20	2021-10-21	2021-10-22	2021-10-23
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	36.0	36.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	25.0	25.0	25.0	24.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	67	58	33	39	55
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	26	18	10	11	20
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8.0	9.0	14.0	15.0	19.0
पवन दिशा (डिग्री)	139	196	260	240	205
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आने वाले पांच दिनों में वर्षा नहीं होने की सम्भावना ।

### सामान्य सलाहकार:

रबी फसलों में दीमक व अन्य कीड़ों की रोकथाम के लिए बुवाई से पूर्व अन्तिम जुताई के समय क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर खेत में डालें।

### लघु संदेश सलाहकार:

चने की फसल को जड़ गलन रोग से बचाने के लिए बीज को कार्बेण्डेजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चना	सी-235, आर.एस.जी-44, आर.एस.जी-888, आर.एस.जी-896, जी.एन.जी-1488, आर.एस.जी-974, जी.एन.जी-1958 व जी.एन.जी-663, चने की उन्नत किस्मों की बुवाई करें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	सिंचित क्षेत्र में सरसों/राया की बुवाई के लिए उचित समय अक्टूबर के अन्त तक है। पूसा सरसों-25, पूसा सरसों-26, पूसा सरसों-27, एन.आर.सी.एच.बी-101, सी.एच-52, टी-59, आर.एच-30, बायो-902, जी.एम-2 व आर.एच-819 उन्नत किस्मों की बुवाई करें। बुवाई के लिए 4-5 किलो बीज प्रति हैक्टेयर के लिए पर्याप्त है। बुवाई के समय 30 किलो नत्रजन व 30 किलो फास्फोरस प्रति हैक्टेयर की दर से दें। मोयला की रोकथाम के लिए बीज को इमिडाक्लोप्रिड 600 एफ.एस. @ 9 मिली. प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। फसल को सफेद रोली रोग के प्रकोप से बचाने के लिए बीज को मेटालेक्सिल 35 एस.डी 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर उपचारित करें।
रेंडी	अरण्डी की फसल में सेमी लूपर कीट की रोकथाम के लिए क्यूनालफॉस 25 ई.सी. 1 लीटर प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
लहसुन	लहसुन की यमुना सफेद, लावा, मलेवा व स्थानीय किस्मों की बुवाई करें। बुवाई हेतु 5 कुन्तल कलियां प्रति हैक्टेयर के लिए पर्याप्त है। बुवाई के समय कतार से कतार की दूरी 15 सेन्टीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 7-8 सेन्टीमीटर रखें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	इस समय मौसम परिवर्तनशील रहने के कारण पशुओं को रात के समय छप्पर में बांधें।