



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 21 फरवरी 2017

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,
जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	22/02/17	23/02/17	24/02/17	25/02/17	26/02/17
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	31	31	32	32	32
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	11	11	10	10	10
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	0	3	0	0	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	65	63	66	64	67
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	14	18	20	20	17
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	7	8	8	9	7
हवा की दिशा	उत्तर- उत्तर- पूर्व	उत्तर	उत्तर- पूर्व	उत्तर- पूर्व	पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
गेहूं व जौ	दूधिया	गेहूं व जौ की फसल में दीमक की रोकथाम के लिए क्लोरोपायरीफॉस 20 ई.सी 4 लीटर प्रति हैक्टेयर सिंचाई के साथ दें।
सरसों	पकाव	जहाँ कहीं सरसों की फसल पक गई हो तो किसान भाई सुबह के समय पकी हुई फसल की कटाई करें।
मिर्च	नर्सरी	मिर्च की फसल के लिए नर्सरी तैयार करें। एक हैक्टेयर क्षेत्र के लिए पौध तैयार करने हेतु एक से डेढ़ किलो बीज प्रयाप्त है। बुवाई से पूर्व 2 ग्राम केप्टान से प्रति किलो बीज को उपचारित करें।
ग्रीष्मकालीन सब्जियां	बुवाई	कुष्माण्ड कुल की ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई करें। लोकी, खरबूजा, तोरई, की उन्नत किस्में निम्नलिखित हैं। लोकी — पूसा समर व पूसा नवीन। खरबूजा — पूसा शर्बती, आर.एम-50 व आर.एम-43। तोरई — पूसा नसदार व पूसा चिकनी। बुवाई के समय 30 किलो नत्रजन, 40 किलो फास्फोरस व 40 किलो पोटस प्रति हैक्टेयर दें।

(नौडल ऑफीसर)