



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
Jodhpur, Rajasthan



Agromet Advisory Bulletin

Date : 03-12-2019

Weather Forecast of JODHPUR(Rajasthan) Issued On : 2019-12-03(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2019-12-04	0.0	28.0	11.0	53	20	11.0	70	0
2019-12-05	0.0	28.0	12.0	54	23	12.0	70	4
2019-12-06	0.0	28.0	12.0	53	29	13.0	50	4
2019-12-07	0.0	28.0	11.0	51	24	11.0	50	0
2019-12-08	0.0	27.0	11.0	52	25	11.0	50	2

Weather Summary/Alert:

There is a possibility of clear weather and no rains in coming days.

आगामी पांच दिनों में मौसम साफ रहने तथा वर्षा नहीं होने की सम्भावना है।

General Advisory:

Irrigation should be given in wheat crop which is in CRI stage (21-25 DAS). Apply 30 kg Nitrogen per hectare after irrigation.

गेहूँ की फसल 21-25 दिन की हो गई हो तो प्रथम सिंचाई करें तथा सिंचाई के बाद 30 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से दें।

SMS Advisory:

Due to variable weather in take special care of infants animals from cold and wrap Jute bag around animal back at night.

नवजात पशुओं को सर्दी से बचाने का विशेष ध्यान रखें तथा रात के समय नवजात पशु की पीठ के चारों ओर जूट की बोरी बांधें।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
BARLEY	First irrigation should be given in barley crop (25-30 DAS). जौ की फसल में बुवाई के 25-30 दिन बाद प्रथम सिंचाई करें।
WHEAT	Irrigation should be given in wheat crop which is in CRI stage (21-25 DAS). Apply 30 kg Nitrogen per hectare after irrigation.

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
	गेहूं की फसल 21-25 दिन की हो गई हो तो प्रथम सिंचाई करें तथा सिंचाई के बाद 30 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर की दर से दें।

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
ONION	Transplanting of mature seedlings of onion crop should be done, recommended dose of fertilizer for N: P: K is 50, 50 and 100 kg per hectare at the time of last ploughing. प्याज की तैयार पौध की रोपाई करें। रोपाई से पूर्व 50 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस एंव 100 किलो पोटाश प्रति हैक्टेयर की दर से खेत तैयार करते समय अन्तिम जुताई के समय दें।
BRINJAL	Give @ 50 kg Nitrogen per hectare with irrigation in brinjal crop (30 DAS). बैंगन की एक महा की फसल पर 50 किलो नत्रजन प्रति हैक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ दें।