



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 13-12-2022

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-12-13 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-12-14	2022-12-15	2022-12-16	2022-12-17	2022-12-18
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	29.0	28.0	28.0	27.0	27.0
न्यूनतम तापमान(से.)	16.0	15.0	15.0	13.0	14.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	32	30	28	24	20
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	15	17	14	12	10
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	13.0	8.0	5.0	6.0	9.0
पवन दिशा (डिग्री)	33	63	150	75	81
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 27.0 से 29.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 13.0 से 16.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

सामान्य सलाहकार:

जीरे की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए ऑक्साडाईरजिल या ऑक्सीफ्लोरफेन 50 ग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से बुवाई के 20 दिन बाद छिड़काव करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में मौसम साफ रहने की सम्भावना है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	गेहूँ की फसल में चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 30-35 दिन बाद क्लोडिनाफॉप प्रोपरगिल 15% + मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल 20% डब्ल्यूपी @ 55-60 ग्राम (ए.आई.) प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करें। छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि फसल पर कहीं भी दोहरा छिड़काव न करें।
जीरा	जीरे की फसल में उखटा रोग का प्रकोप पौधों की छोटी अवस्था में अधिक होता है। रोग के नियंत्रण के लिए दो ग्राम मैन्कोजेब प्रति लीटर पानी की दर से बुवाई के 20 दिन बाद छिड़काव करें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
जौ	जहाँ जौ की फसल 21 दिन की हो गई हों वहाँ प्रथम सिंचाई करे। सिंचाई के साथ नत्रजन की दूसरी मात्रा डालें।
चना	चने की फसल में रूट रोट रोग के लक्षण दिखाई देने पर पौधे को जड़ सहित उखाड़ने पर जड़ में सफेद फफूंद की वृद्धि दिखाई देती है। पौधा मुरझा कर सुख जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए कार्बेन्डाजिम 50 डब्ल्यू पी को 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें।