



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 16 जून 2017

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	17/06/17	18/06/17	19/06/17	20/06/17	21/06/17
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	41	42	41	42	42
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	27	28	27	26	26
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	0	1	0	0	1
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	74	72	74	71	75
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	17	18	15	14	15
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	7	10	8	9	8
हवा की दिशा	दक्षिण- दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम	दक्षिण- दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
मूंगफली		मूंगफली में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के दो दिन बाद 3 लीटर पेंडीमेथालिन का प्रति हैक्टेयर में छिड़काव करें।
लोकी तोरई, टिन्डा	बुवाई	कुष्माण्ड कुल की सब्जियों की निम्न किस्मों की बुवाई करें। लोकी — पूसा नवीन व पूसा मेघदूत। तोरई — पूसा नसदार, पूसा चिकनी व अरका सुजात। टिन्डा — बीकानेरी ग्रीन, अरका टिन्डा व टिन्डा लुधियाना।
टमाटर	नर्सरी	टमाटर की फसल के लिए नर्सरी तैयार एक हैक्टेयर के लिए 400-500 ग्राम बीज प्रयाप्त है।
पशु		इस समय पशुओं में हरे चारे की कमी से विटामिन "ए" की कमी हो जाती है जिसके कारण गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः डॉक्टर की सलाह से गर्भित पशु को विटामिन "ए" के टीके लगवाएं।

(नौडल ऑफीसर)