



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान  
जोधपुर, राजस्थान



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-10-2023

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-10-20 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-10-21	2023-10-22	2023-10-23	2023-10-24	2023-10-25
वर्षा (मिमी)	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	33.0	32.0	33.0	32.0
न्यूनतम तापमान(से.)	20.0	21.0	20.0	20.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	31	30	35	33	28
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	19	19	15	17
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	6	7	10	11
पवन दिशा (डिग्री)	152	248	336	44	66
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	3	2	1	3

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 32.0 से 33.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 20.0 से 21.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

### सामान्य सलाहकार:

किसान भाई रबी फसलों में दीमक और अन्य मिट्टी के कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए अंतिम जुताई के समय किनालफॉस 1.5% @ 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से दे।

### लघु संदेश सलाहकार:

22 और 23 अक्टूबर को हल्की वर्षा की सम्भावना है।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	सरसों/राया की आर.एच -30, बायो-902, आशीर्वाद, सी.एच 54, डी.आर.एम.आर.आई.जे 31 (गिरिरीज), पुसा सरसों 26, पुसा सरसों 27, वाई.एस.एच 0401 (पीली सरसों) एवं आर.जी.एन.145 उन्नत किस्मों की बुवाई करें।
सरसों	अंतिम जुताई के समय 30 किलोग्राम नत्रजन तथा 35 किलोग्राम फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से दे। बीज को 30 सेंटीमीटर (कतार से कतार) तथा 10 सेंटीमीटर (पौधा से पौधा) की दूरी पर बोएं बुवाई हेतु 4-5

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	किलो ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है।
सरसों	रस चूसने वाले कीटों के प्रबंधन के लिए बुआई से एक दिन पहले बीज को थायमेथोक्साम 30 एफएस 7 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	प्याज की पौध तैयार करने के लिए क्यारियां तैयार करें। पूसा रेड, नासिक रेड, आर.ओ-252, हिसार प्याज-3, उदयपुर -102, पूसा व्हाइट फ्लेट व अकोला सफेद प्याज की उन्नत किस्में हैं। एक हेक्टेयर फसल लगाने के लिए 10 किलो बीज पर्याप्त होता है।
मेंथी	मेंथी की फसल की बुवाई का समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक है। बुवाई के लिए खाद, बीज तथा बीज उपचार हेतु रसायन की व्यवस्था करें। RMT-I व RMT-305 उन्नत किस्में हैं।

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	सीधी बुवाई वाली सब्जियों पालक, धनिया, गाजर, मटर और मूली के लिये खेत तैयार करें तथा बीज की व्यवस्था करें।